



ଛାତିୟା ଚାଷ

ଜଳବାୟୁ

ଏହା ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଦରକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷସାରା ଲଗାଯାଇପାରେ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୧୫୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ । ୨୫-୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ । ତୁଷାରପାତ ସହି ପାରେନି । ଫୁଲ ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫଳ କମିଯାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା

ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର, ନିଗିଡ଼ା, ଦୋରସା ମାଟିରେ ଭଲ ହୁଏ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୬ ରୁ ୭ ଭିତରେ ଭଲ ହୁଏ ।

କିସମ

ଏପିଏୟୁ ସଥା, ସିଓ-୧, ସିଓ-୨, ଏମ୍‌ଡିୟୁ-୧, ପିକେମ୍-୧, ଶ୍ୱେତା

ବିହନ

ଏକର ପ୍ରତି ଏକ କିଗ୍ରା. ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ୧୨ ରୁ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇଲେ ଭଲ ଗଜା ହୁଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବ (୩ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ/୧କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି) ।

ବିହନ ବୁଣିବା

ଜମିକୁ ୨-୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ଗାଡ଼ି ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ୨ମିଟର ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ଦେଡ଼ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୫ସେ.ମି. ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଗଭୀରରେ ଗାତ ଖୋଳି ମୂଳ ସାର ଦେଇ ପ୍ରତି

ଗାତରେ ୪-୫ ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଏ । ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପିଛା ୨୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର, ୧୫କି.ଗ୍ରା. ସୁପର ସାର ଓ ୧୫କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଦିଆଯାଏ । ଲଗାଇବା ବେଳେ ସବୁଯାକ ସୁପର ଓ ପଟାସ୍ ସାର ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ଅଧା ଦିଆଯାଏ । ବାକିତକ ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଏ । ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଓ ଜାନୁୟାରୀ-ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଇ ପାରେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ

ଚରା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରତି ମସାରେ ୨-୩ଟି ଚାରା ରଖନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ଫସଲକୁ ଭାଡ଼ିକରି ମଡ଼ାଇଲେ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳେ । ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ଗଛମୂଳକୁ ମାଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ରତ୍ନରେ ବତର ଦେଖି ୭-୮ ଦିନରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ୨ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଥ୍ରେଲ ୨୫୦ ପିପିଏମ୍. ଲା ମାଲିକ ହାଇଡ୍ରାଜାଇଡ ୧୫୦ପି.ପି.ଏମ୍. ପକାଇଲେ ଅଧିକ ମାଈ ଫୁଲ ହୁଏ । ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ ୨-୩ ଥର ପକାଇଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳେ ।

ଅମଳ

ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ୫୦ ରୁ ୭୦ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଦିଏ । କର୍ଅଁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୋଳାଯାଏ । ଏକର ପିଛା ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳେ ।